

Preparación para estudio

BIOPSIAS



PARA TODAS LAS BIOPSIAS SE DEBE TENER EN CUENTA

Si el usuario toma:

Antiagregantes plaquetarios se deben suspender 7 días antes. Ejemplos: Ácido acetilsalicílico (aspirina), Clopidogrel (Plavix®), Ticlopidina (Ticlid®), Dipyridamol (Persantin®, Persantin Retard®), Prasugrel, Ticagrelor, Cangrelor, Elinogrel, Abcixcimab, Tirofibán.

Retomar su consumo 1 día después de la biopsia.

Si el usuario toma:

Anticoagulantes vía oral o inyectables se deben suspender desde 3 días antes. Ejemplos de anticoagulantes orales: Apixabán (Eliquis®), Dabigatrán (Pradaxa®), Edoxabán (Lixiana®), Rivaroxabán (Xarelto®) y Warfarina (Coumadin). Ejemplos de anticoagulante inyectables: Enoxaparina, que se vende con los nombres Clexane y Hepaxane.

Retomar su consumo 1 día después de la biopsia.

Biopsia de Glándula Suprarrenal o Riñón

Traer resultado de Hemograma Completo no mayor a 1 mes.

Traer resultado de Tiempo de protrombina (TP) no mayor a 1 mes.

Traer resultado de Tiempo parcial de tromboplastina (TPT) no mayor a 1 mes.

Traer resultado de International Normalized Ratio (INR) no mayor a 1 mes.

Venir en ayunas.

Debe venir con un acompañante adulto.

Importante: si el paciente toma anticoagulantes (aspirina, enoxaparina, daltaparina, heparina, asa) debe suspender 4 días antes del procedimiento y si toma cumadina (warfarina) no se debe realizar el estudio y el paciente debe consultar a su médico el procedimiento a seguir.

Si el paciente toma medicamentos esenciales (para la hipertensión, diabetes, asma, convulsión) debe tomarlos preferiblemente sin agua.



Biopsia o Punción por Vía Transrectal de Próstata

- Tomar el día anterior 1 tableta de Ácido tranexámico de 500mg a las 7am y otra a las 7pm.
- La noche anterior al examen colocarse un enema rectal. 7:00 pm.
- 2 horas antes del estudio debe colocarse el segundo enema rectal.
- Preferiblemente dar cita a las 7:00am.
- Traer 2 preservativos.
- Traer resultado de Cuadro Hemático, no mayor a 1 mes.
- Traer resultado de International Normalized Ratio (INR), no mayor a 1 mes.
- Traer resultado de urocultivo, no mayor a 1 mes.
- Tomar pre y post-procedimiento la administración profiláctica de antibióticos:
 - ciprofloxacina 500 mg, empezar tres días antes del estudio; tomar 1 cada 12 horas por 7 días.
 - Tomar Secnidazol cápsulas de 1gr, dos capsulas 48 horas antes del estudio y otras dos 24 horas antes del estudio.
- Traer la Roxicaina gel 2% de 30 mL.
- Traer 1 pañal desechable.
- Venir en ayunas.
- Debe venir con un acompañante adulto.
- Tomar el día después 1 tableta de Ácido tranexámico de 500mg a las 7am y otra a las 7pm
- Importante: si el paciente toma anticoagulantes (aspirina, enoxaparina, daltaparina, heparina, asa) se debe informar al médico radiólogo para su conducta. y si toma cumadina (warfarina) no se debe realizar el estudio y el paciente debe consultar a su médico el procedimiento a seguir.
- Si el paciente toma medicamentos esenciales (para la hipertensión, diabetes, asma, convulsión) debe tomarlos.



Biopsia o Punción de Hígado

- Traer resultado de Hemograma Completo no mayor a 1 mes.
- Traer resultado de Tiempo de protrombina (TP) no mayor a 1 mes.
- Traer resultado de Tiempo parcial de tromboplastina (TPT) no mayor a 1 mes.
- Traer resultado de International Normalized Ratio (INR) no mayor a 1 mes.
- Venir en ayunas.
- Debe venir con un acompañante adulto.
- Importante: si el paciente toma anticoagulantes (aspirina, enoxaparina, daltaparina, heparina, asa) debe suspender 4 días antes del procedimiento y si toma cumadina (warfarina) no se debe realizar el estudio y el paciente debe consultar a su médico el procedimiento a seguir.
- Si el paciente toma medicamentos esenciales (para la hipertensión, diabetes, asma, convulsión) debe tomarlos preferiblemente sin agua.

Biopsia de Tiroides, Mama y Tejidos Blandos

Paciente no debe tener gripa o tos

