Preparación para estudio

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA

SIMAG

TAC de Pelvis Simple

Tomar preparación oral:
Se solicita al paciente dos botellas de agua de 600cc, sin gas. Se preparan echando 6 cc de contraste oral. Preparación realizada en nuestras IPS. Se entrega una botella al paciente para que de 2 a 6 horas antes del estudio se la tome y la otra queda en nuestra institución para ser tomada 15 minutos antes de realizar el estudio.

Para niños mayores de 6 meses se solicita al paciente una botella de agua de 600cc. Se prepara colocando 6 cc de contraste oral. Preparación realizada en nuestra IPS. Se entrega la botella al paciente para que de 2 a 6 horas antes del estudio se la tome la mitad y la otra mitad antes del estudio.

TAC de Abdomen Simple

Tomar preparación oral:
Se solicita al paciente dos botellas de agua de 600cc, sin gas. Se preparan echando 6 cc de contraste oral. Preparación realizada en nuestra IPS. Se entrega una botella al paciente para que de 2 a 6 horas antes del estudio se la tome y la otra queda en nuestra institución para ser tomada 15 minutos antes de realizar el estudio.

Para niños mayores de 6 meses se solicita al paciente una botella de agua de 600cc. Se prepara colocando 6 cc de contraste oral. Preparación realizada en nuestra IPS. Se entrega una botella al paciente que de 2 a 6 horas antes del estudio se la tome y la otra queda en nuestra institución para ser tomada 15 minutos antes de realizar el estudio.
El paciente debe tener de 4 a 8 horas de ayuno.

TAC de Higado Trifásico

El paciente debe tener de 4 a 8 horas de ayuno. Deberá enviar examen de laboratorio de Creatinina en sangre, por vía correo electrónico o WhatsApp, para verificar el resultado; si sobrepasa los valores del rango del laboratorio, se debe solicitar el peso y la estatura del paciente actual para realizar tasa de filtración glomerular y en base a esto el medico radiólogo será quien tome la decisión, Si el medico radiólogo da el aval de realizar el estudio se procede a citar al paciente, de lo contrario se sugiere al paciente solicitar al médico tratante estudio simple.
Adicionalmente se debe tener en cuenta la vigencia establecida para el Laboratorio de Creatinina:
VIGENCIA: 1 mes. Para pacientes hospitalizados 8 días.

Urotac

Tomar un litro de agua, 1 o 2 horas antes de la realización del estudio. Si el estudio es contrastado, no se debe tomar el agua. Si es contrastado deberá enviar examen de laboratorio de Creatinina en sangre, por vía correo electrónico o WhatsApp, para verificar el resultado; si sobrepasa los valores del rango del laboratorio, se debe solicitar el peso y la estatura del paciente actual para realizar tasa de filtración glomerular y en base a esto el medico radiólogo será quien tome la decisión, Si el medico radiólogo da el aval de realizar el estudio se procede a citar al paciente, de lo contrario se sugiere al paciente solicitar al médico tratante estudio simple.
Adicionalmente se debe tener en cuenta la vigencia establecida para el Laboratorio de Creatinina:
VIGENCIA: 1 mes. Para pacientes hospitalizados 8 días.

Angiotac y estudios de tomografia axial computarizada contrastadas

Si el paciente requiere un estudio contrastado deberá enviar examen de laboratorio de Creatinina en sangre, por vía correo electrónico o WhatsApp, para verificar el resultado; si sobrepasa los valores del rango del laboratorio, se debe solicitar el peso y la estatura del paciente actual para realizar tasa de filtración glomerular y en base a esto el medico radiólogo será quien tome la decisión, Si el medico radiólogo da el aval de realizar el estudio se procede a citar al paciente, de lo contrario se sugiere al paciente solicitar al médico tratante estudio simple.
Adicionalmente se debe tener en cuenta la vigencia establecida para el Laboratorio de Creatinina:
VIGENCIA: 1 mes. Para pacientes hospitalizados 8 días.
Para todos los estudios contrastados se debe solicitar al paciente traer un acompañante y es fundamental sugerir hidratación desde las 24 horas antes del estudio.
Cuando se vaya a agendar un paciente que se haya realizado estudios contrastados, se debe esperar mínimo 4 días para realizar el próximo estudio contrastado. Estos pacientes deberán realizarse nuevamente laboratorio de Creatinina, ya que los niveles cambian con la aplicación del medio de contraste.

Los pacientes hospitalizados que requieran estudios contrastados, se les debe solicitar traer una vena permeable independiente a la que se esté usando con catéter de 18 o 20 en pacientes adultos y 22 o 24 en pacientes pediátricos.

Angiotac y estudios de tomografia axial computarizada contrastadas

Tener en cuenta que en PARAMEDICOS S.A no se deben formular medicamentos para nefroprotección. Esto es competencia del médico tratante o nefrólogo.

- Todo paciente que requiera estudio con utilización de medio de contraste intravenoso requiere ayuno.
- Si el paciente es hipertenso se le recalca que se debe tomar su medicamento habitual
- Tener de 4 a 8 horas de ayuno.
- Los pacientes hospitalizados que requieran estudios contrastados, se les debe solicitar traer una vena permeable independiente a la que se este usando con catéter de 18 o 20 en pacientes adultos y 22 o 24 en pacientes pediátricos.

Nota. Tener en cuenta que los Tac de abdomen contrastados también requieren la preparación del Tac de abdomen simple, que se encuentra detallado en este protocolo.

Notas Aclaratorias:

- Si el paciente es lactante y se realiza una Tomografía Contrastada debe suspender la lactancia por 24 horas.
- Si el paciente es lactante y se realiza una Resonancia Magnética Contrastada debe suspender la lactancia por 24 horas.